El agua desciende hacia el interior del karst pero también puede ascender desde lugares muy profundos

Las galerías y conductos por donde circulan las aguas se clasifican dependiendo de hacia dónde se dirigen

Hay formas de conducción descendentes…

El agua desciende hacia el nivel freático por la red de fisuras y fracturas de la roca.
Son característicos los grandes pozos que pueden acumular permanentemente nieve o hielo en su fondo. En sus bordes presentan formas típicas de disolución: acanaladuras, estrías,…

… subhorizontales,

Los niveles altos de la zona de aireación suelen ser inactivos, con presencia abundante de *espeleotemas,* así como de sedimentos, incluidos los bloques desprendidos de paredes y techo.
Los conductos de la zona de fluctuación presentan con frecuencia sedimentos fluviales y materia orgánica depositados en las grandes crecidas. Las galerías de la zona freática, permanentemente anegadas y sólo accesibles con técnicas de espeleobuceo, suelen presentar sedimentos arcillosos. En las paredes, techos y suelos se observan morfologías típicas de la disolución de la roca: conductos de techo, huellas de corriente, pendants,…

… y ascendentes

En ocasiones, las aguas pueden estar confinadas a gran profundidad, entre estratos impermeables, y sólo vuelven a ascender, generalmente aprovechando alguna falla, a muchos kilómetros de distancia. Es el caso de las *aguas termales,* cuyo origen suele ser muy profundo, o las más habituales *fuentes vauclusianas* por donde ascienden hasta el nivel de base las aguas cautivas o confinadas. Las formas de disolución propias de este tipo de conductos son las chimeneas ascendentes, cúpulas…

Esta roca parecea haber querido enseñarnos cómo es un karst en su interior…